

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**із застосування засобу “Соліклор” (“Solikloor”)  
з метою дезінфекції та дестерилізаційного очищення**

Організація-розробник – ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за участю компанії «Baltiachemi OU» (Естонія).

Ця Інструкція розроблена в розвиток «Методичних вказівок щодо застосування дезінфекційного засобу “Соліклор” (“Solikloor”) з метою дезінфекції і дестерилізаційного очищенння» (№288-2013 від 22 жовтня 2013 р.) і призначена для персоналу закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують дезінфекційні роботи.

Користувачам засобу “Соліклор” (“Solikloor”) дозволяється тиражування цієї інструкції у необхідній кількості примірників.

Засіб «Соліклор» («Solikloor») внесено до Державного реєстру дезінфекційних засобів 2018 р. за №51

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на засіб дезінфекційний «Соліклор» («Solikloor») від 07.02.2018 р. №602-123-20-5/3986, затверджено головою Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Лапа В.І.

## ІНСТРУКЦІЯ

Із застосування дезінфекційного засобу "Соліклор" ("Solikloor") з метою дезінфекції та дестерилізаційного очищення

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб "Соліклор" ("Solikloor").**

**1.2. Виробник - "BALTIACHEMI OU" (Естонія).**

**1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:** в залежності від препаративної форми і модифікації:

- **засіб у формі таблеток містить:** натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80-85% (активно діюча речовина); адипінова кислота і карбонат натрію у рівному співвідношенні - разом 15-20% (допоміжні речовини);

- **засіб у формі гранул містить:** натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти - 80-85% (діюча речовина); допоміжні речовини (в т.ч. ПАР, регулятори pH, антикорозійний компонент, наповнювачі) до 100%.

**1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу.** Засіб "Соліклор" виробляється у двох препаративних формах: у вигляді швидкорозчинних шипучих таблеток з різним вмістом активного хлору та дрібних гранул.

**Засіб у формі таблеток.** Таблетки засобу білого кольору круглої форми, можуть мати на поверхні насічки, які дозволяють ділити таблетку. Вміст активного хлору в таблетках може бути різним, зокрема, 1,8 г, 1,5 г, 1,0 г, 0,5 г, 0,3 г, 0,15 г. Допоміжні речовини (адипінова кислота і карбонат натрію) прискорюють розчинення таблеток, регулюють pH розчину, встановлюючи його в оптимальному для антимікробної дії діапазоні, зменшують корозійну і фіксуючу дію розчинів. При приготуванні робочих розчинів таблетки добре розчиняються у воді. Водні розчини прозорі, мають слабкий запах хлору; мають мийні (видаляють механічні і нестійкі забруднення) та відбілюючі властивості; не фіксують на поверхнях обробки органічні забруднення, добре змиваються з оброблених поверхонь, не залишаючи слідів і нальоту. Для посилення мийних властивостей розчинів, приготовлених із таблеток засобу "Соліклор", можливе додавання до розчинів миючих засобів (достатня кількість до 0,5%).

**Засіб у формі гранул.** Гранули засобу дрібні за розмірами, білого кольору та різної форми, вільно висипаються і не злипаються. Виробляються з вмістом активного хлору не менше 45,0% та не менше 30%. При приготуванні робочих розчинів добре розчиняються у воді. Водні розчини майже прозорі або з опалесценцією, при збовтуванні утворюють піну, з помірним запахом хлору; мають відбілюючі, змочувальні, високі мийні (мийна здатність не менше 50% по відношенню до еталону), емульгуючі, гомогенізуючі і диспергуючі властивості, видаляють білкові, жирові, механічні забруднення, залишки крові та лікарських засобів; не фіксують на поверхнях обробки органічні забруднення, добре змиваються з оброблених поверхонь, не залишаючи слідів і нальоту.

Засіб “Соліктор” сумісний з багатьма конструктивними матеріалами, робочі розчини засобу не пошкоджують деревину (у т.ч. з лакофарбовим покриттям), скло, лінолеум та інші полімерні матеріали, корозійностійкі метали, а також чорні метали з лакофарбовим покриттям), гуму (в т.ч. на основі силіконового та натурального каучуку) і пластмаси, не провокують і не посилюють виділення летких хімічних речовин з поверхонь, що обробляються.

Засіб сумісний з милами, сульфованими маслами, аніонними, амфотерними та неіоногенними поверхнево-активними речовинами, солями лужних металів неорганічних і органічних кислот; пожежо- і вибухобезпечний.

### **1.5. Призначення засобу.**

У вигляді робочих розчинів, приготовлених з таблеток або гранул, засіб призначено для проведення профілактичної, поточної, заключної дезінфекції, генеральних прибирань:

1.5.1. в лікувально-профілактичних закладах будь-якого профілю незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, включаючи хірургічні, акушерсько-гінекологічні, неонатологічні, травматологічні, стоматологічні, урологічні і інші відділення хірургічного профілю; в соматичних, фізіотерапевтичних і реабілітаційних відділеннях; в клінічних, бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, імунологічних лабораторіях; в протитуберкульозних, шкірно-венерологічних, мікологічних і інфекційних відділеннях, інфекційних вогнищах; у відділеннях переливання крові і донорських пунктах; в аптечних закладах (аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски, аптечні склади), поліклініках для дітей і дорослих, медсанчастинах і медпунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах, в санітарних пропускниках; в патологоанатомічних відділеннях, моргах, відділеннях судмедекспертизи; в дитячих закладах:

1.5.1.1. для дезінфекції виробів медичного призначення, включаючи стоматологічні інструменти із корозійностійких металів (в т.ч. з низьковуглецевої сталі, нікельованих металів), скла, пластмас, гуми на основі силіконового і натурального каучуку (за винятком ендоскопів);

1.5.1.2. для дезінфекції, в т.ч. поєднаної з достерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначення, лабораторного посуду, перукарських, манікюрних і косметологічних інструментів і приладдя;

1.5.1.3. для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих меблів, медичних апаратів та приладів, санітарно-технічного обладнання (ванни, душові, унітази, раковини), посуду столового, аптечного і лабораторного (в т.ч. одноразового використання, пробірки, піпетки, предметне і покривне скло, циліндри, колби, чашки Петрі, планшети для імунологічних аналізів тощо), іграшок, білизни, предметів догляду хворих, прибирального інвентарю, взуття з гуми, пластмас і інших полімерних матеріалів, гумових килимків;

1.5.1.4. для дезінфекції сплювальниць, зливово-димоктуючих систем стоматологічних установок, плювальниць, зубних протезів і заготівок з пластмас, кераміки, металів;

1.5.1.5. для дезінфекції плювальниць, звільнених від мокротиння, камер для збору мокротиння, дезінфекції видіlenь хворих і біологічних рідин всіх видів (фекалій, сечі, мокротиння, крові, сироватки, еритроцитарної маси) у т.ч. біологічних рідин, розлитих на поверхні, промивних вод;

1.5.1.6. для знезараження медичних відходів, в т.ч. з текстильних матеріалів (включаючи відпрацьований перев'язувальний матеріал, ватяні кульки, тампони, медичний одяг і білизну одноразового використання, маски), виробів медичного призначення одноразового використання і біологічних рідин перед їх утилізацією;

1.5.1.7. для дезінфекції і вибілювання білизни та інших текстильних виробів;

1.5.1.8. для знезараження повітря і дезінфекції поверхонь у приміщеннях аерозольним методом при інфекційних захворюваннях, а також для боротьби з пліснявою із застосуванням генераторів високодисперсних аерозолів (дисперсність  $\geq 1 \text{ мкм}$ );

1.5.1.9. для облаштування санітарних бар'єрів (в дезінфікуючих килимках);

1.5.1.10. для дезінфекції, миття і дезодорування сміттєзбирального устаткування, неметалевих контейнерів для медичних відходів й сміттезбирників;

1.5.1.11. для дезінфекції санітарного автотранспорту, транспорту для перевезення харчових продуктів і сировини, транспорту для перевезення сміття та ін.;

**1.5.2. Для проведення профілактичної, поточної, заключної дезінфекції та генеральних прибирань:**

1.5.2.1. в санаторно-курортних закладах, в місцях масового відпочинку,

1.5.2.2. на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, харчопереробної промисловості;

1.5.2.3. в закладах ресторанного господарства (ресторани, фабрики-кухні, кафе та ін.) і торгівлі (для обробки поверхонь приміщень і технологічного обладнання, столового і кухонного посуду й інвентарю і та ін., для дезінфекції шкарпу харчових яєць);

1.5.2.4. в дитячих дошкільних і навчальних закладах усіх рівнів акредитації, спортивно-оздоровчих і спортивно-розважальних комплексах (в т.ч. в плавальних басейнах, акваліфікаційних центрах, включаючи душові, розтягальні, санітарні кімнати та ін. (в т.ч. для обробки санітарно-технічного обладнання, поверхонь приміщень, санвузлів, гардеробних, ванн, гідромасажних ванн, басейнів, поверхонь з плитковим покриттям та ін.);

1.5.2.6. на об'єктах і в установах соціального забезпечення (будинки пристарілих, інтернати, центри соціальної реабілітації тощо);

1.5.2.7. в аптечних закладах (в т.ч. аптечних кіосках і складах);

1.5.2.8. в закладах і на об'єктах комунально-побутового обслуговування і призначення (в т.ч. в саунах, лазнях, громадських туалетах (в т.ч. для знезараження накопичувальних баків автономних туалетів), душових, санпропускниках, перукарнях, салонах краси, пірсінгу і татуювання, манікюрних, педікюрних і косметологічних кабінетах, СПА-салонах, пральннях, хімчистках тощо);

1.5.2.9. у громадських і адміністративних закладах і будівлях;

1.5.2.10. в місцях постійного і тимчасового проживання (готелі, гуртожитки, квартири тощо);

1.5.2.11. в підприємствах зв'язку і банківських установах;

1.5.2.12. на об'єктах прибирання клінінговими компаніями;

1.5.2.13. на об'єктах і в підрозділах міністерств внутрішніх справ та оборони (в т.ч. в казармах), в установах пенітенціарної системи;

1.5.2.14. на об'єктах водопостачання і каналізування, підприємствах з транспортування, сортування і переробки сміття;

1.5.2.15. в умовах надзвичайних ситуацій;

1.5.2.16. на рухому складі і об'єктах забезпечення громадського пасажирського міського (в т.ч. метрополітен), залізничного (в т.ч. пасажирського і вантажного), водного, повітряного ( наземні служби і об'єкти);

**1.5.3. Засіб призначено також:**

1.5.3.1. для знезараження питної води і води в басейнах, дезінфекції ємностей для зберігання і транспортування питної води, водопровідних споруд;

1.5.3.2. для знезараження стічних вод, каналізаційних стоків і систем їх відведення;

1.5.3.3. для боротьби з пліснявою і попередження її появи;

1.5.3.4. для дезінфекції на епідемічно-значимих об'єктах інших галузей виробництва та сфери послуг, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.

1.5.3.5. засіб у формі гранул призначено також для знезараження рідких виділень (крім сечі), крові (в т.ч. згустків), сироватки, ліквору та інших біологічних речовин при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити, поліомієліт та ВІЛ-інфекцію) і грибкової (кандидози, дерматомікози) етіології у лікувально-профілактичних закладах, бактеріологічних і клінічних лабораторіях, станціях переливання крові, на санітарному транспорті тощо; для чищення санітарно-технічного обладнання.

**1.6. Спектр антимікробної дії.** Засіб “Соліклор” має широкий спектр дезінфекційної дії, виявляє бактерицидні властивості проти широкого спектру грам-негативних та грам-позитивних бактерій (включаючи *S.aureus*, метіцилін-резістентний стафілокок (MRSA), *P.aeruginosa*, збудників дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, тутляремії, спороутворюючі мікроорганізми роду *Bacillus* і *Clostridium*, збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій), **туберкулоцидні\***, **віруліцидні** (в т.ч. проти збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпесу, грипу всіх типів, парагрипу, пташиного грипу, SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт, Коксакі, ЕCHO), корона-вірусної, респіраторно-синцитіальні, ріновірусної, рота-вірусної, цитомегаловірусної інфекції тощо), **фунгіцидні** (проти патогенних грибів роду Кандида, Трихофітон, а також *A.niger* (ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви, у т.ч. в споровій формі) властивості. (\**Примітка. Туберкулоцидна дія засобу досліджена на тест-штамі Mycobacterium tuberculosis ATCC 15755*). Засіб ефективний проти збудників паразитарних хвороб (цист і ооцист найпростіших, яєць й личинок гельмінтів).

**1.7. Токсичність та безпечність засобу.** Засіб “Соліклор” за параметрами гострої токсичності згідно ГОСТ 12.1.007-76 належить до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок лабораторних та до 4 класу мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру та при парентеральному введенні, у формі таблеток в насичуючих концентраціях пари відноситься до 4 класу малонебезпечних засобів.

В умовах інгаляційної дії у вигляді пари належить до 4 класу мало небезпечних речовин за ступенем леткості. Засіб не має шкірно-резорбтивної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, ембріотоксичної та канцерогенної дії, сенсибілізуючі, кумулятивні властивості виражені слабко.

Робочі розчини засобу в умовах одноразовоїapplікації не спричиняють місцево-подразнювальної дії на шкіру та слизові оболонки очей. При багаторазовому наїссянні спричиняють сухість і пущення шкіри Робочі розчини в концентраціях від 0,015% до 0,1% (за активним хлором) у вигляді пари не викликають подразнення органів дихання. Більш високі концентрації за активним хлором викликають подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та очей.

## 2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

**2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів.** Робочі розчини засобу “Соліклор” готують в промаркованих місткостях шляхом розчинення певної кількості таблеток або гранул у воді.

При використанні засобу для знезараження води і для приготування робочих розчинів для дезінфекції слід керуватись кількістю активного хлору в таблетках засобу і гранулах.

За необхідності, для посилення мийних властивостей робочих розчинів, приготовлених із засобу “Соліклор”, до розчинів додають 0,5% мийного засобу типу «Лотос», «Астра», «Айна», «Прогрес» або аналогічного.

**2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів.** Для приготування робочого розчину певну кількість таблеток (шт.) розчиняють у воді відповідно до розрахунків.

2.2.1. Формула для розрахунку кількості води (V ) (мл) для приготування робочого розчину необхідної концентрації (C) (% за активним хлором) із 1 таблетки засобу з вмістом активного хлору 1,5 г (A):

$$V = \frac{A \times 100}{C}, \quad (1)$$

де:

V – кількість води (мл), необхідна для отримання розчину з потрібним вмістом активного хлору;

A – вміст активного хлору в таблетці, г;

C – необхідна концентрація активного хлору в робочому розчині, %.

2.2.2. Формула для розрахунку кількості таблеток засобу (n) (шт.), потрібної для приготування визначеної кількості робочого розчину (V) (л) необхідної концентрації (C) (%) за активним хлором) із таблеток засобу з вмістом активного хлору 1,5 г:

$$n = \frac{V \times C \times 10}{1,5}, \quad (2)$$

де:

V – необхідна кількість робочого розчину, л;

1,5 – вміст активного хлору в одній таблетці, г;

C – необхідна концентрація активного хлору в робочому розчині, %.

2.2.3. Готові розрахунки для приготування робочих розчинів засобу із таблеток, що містять 1,5 г активного хлору, а також гранул, з вмістом активного хлору 45% та 30% наведено у таблицях 1 - 5.

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу "Соліклор" із таблеток, що містять 1,5 г активного хлору

Концентрація розчину, % за активним хлором	Кількість таблеток, шт	Кількість води, л
0,01	1	15
0,015	1	10
0,03	1	5
	2	10
0,06	2	5
	4	10
0,1	7	10
0,15	5	5
	10	10
0,2	7	5
	14	10
0,3	10	5
	20	10
1,0	33	5
	67	10
3,0	100	5
	200	10

Таблиця 2. Приготування робочих розчинів засобу "Соліклор" із гранул з вмістом активного хлору 45%

Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Маса гранул (г) для приготування робочого розчину об'ємом (л)		
	1,0 л	5,0 л	10,0 л
0,01	0,22	1,1	2,2
0,015	0,33	1,7	3,3
0,03	0,7	3,3	6,7

Продовження таблиці 2

0,06	1,4	6,7	13,3
0,1	2,2	11,0	22,0
0,15	3,3	16,5	33,0
0,2	4,5	22,2	44,4
0,3	6,7	33,3	66,7
1,0	22,0	111,0	220,0
3,0	66,7	333,3	667,0

Таблиця 3. Приготування робочих розчинів засобу “Соліклор” із гранул з вмістом активного хлору 30%

Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Маса гранул (г) для приготування робочого розчину об'ємом (л)		
	1,0 л	5,0 л	10,0 л
0,01	0,33	1,7	3,4
0,015	0,5	2,5	5,0
0,03	1,0	5,0	10,0
0,06	2,0	10,0	20,0
0,1	3,33	16,8	33,6
0,15	5,0	25,0	50,0
0,2	6,66	33,6	67,2
0,3	10,0	50,0	100,0
1,0	33,3	168,0	336,0
3,0	100,0	500,0	1000,0

2.2.4. Банки з гранулами засобу “Соліклор” комплектуються мірною ложкою для дозування засобу. Повна (з верхом) мірна ложка вміщує не менше 20 г гранул. Розрахунки для приготування робочих розчинів засобу з використанням мірної ложки наведено в таблицях 4 і 5.

Таблиця 4. Приготування робочих розчинів засобу “Соліклор” із гранул з вмістом активного хлору 45% з використанням мірної ложки на 20 г гранул (розрахунок на 1 мірну ложку гранул).

Концентрація робочого розчину засобу, % (за активним хлором)	Кількість води, л
0,01	90,0
0,015	60,0
0,03	30,0
0,06	15,0
0,1	9,0
0,15	6,0
0,2	4,5
0,3	3,0
1,0	0,9
3,0	0,3

Таблиця 5. Приготування робочих розчинів засобу “Соліклор” із гранул з вмістом активного хлору 30% з використанням мірної ложки на 20 г гранул (розрахунок на 1 мірну ложку гранул)

Концентрація робочого розчину засобу, % (за активним хлором)	Кількість води, л
0,01	60,0
0,015	40,0

0,03	20,0
0,06	10,0
0,1	6,0
0,15	4,0
0,2	3,0
0,3	2,0
1,0	0,6
3,0	0,2

**2.3. Розрахунки для приготування робочих розчинів з маточного розчину.** Для приготування робочих розчинів засобу “Соліклор” в концентрації 0,01%, 0,015% і 0,03% за активним хлором можливо також приготувати з початку розчин у концентрації 0,06% за активним хлором і, використовуючи його як маточний розчин, змішати його з водою у співвідношенні, вказаному в таблиці 6.

Таблиця 6. Приготування робочих розчинів засобу “Соліклор” з маточного розчину

Необхідна концентрація розчину, % (за активним хлором)	Кількість об'ємних частин (або літрів) розчину в концентрації 0,06% (за активним хлором)	Кількість об'ємних частин (або літрів) води
0,01	1	5
0,015	1	3
0,03	1	1

**2.4. Термін та умови зберігання робочих розчинів.** Термін зберігання робочих розчинів – 5 діб за умови зберігання у закритих місткостях у темному місці (*Примітка. Термін вказано у відповідності до результатів проведених досліджень для розчинів різних концентрацій*). Для дезінфекції об'єктів методом занурення (зокрема, виробів медичного призначення, столового і лабораторного посуду) робочі розчини можуть бути використані багаторазово в межах терміну придатності (5 діб) при відсутності зміни початкового зовнішнього вигляду розчину (відсутність помутніння, осаду або забарвлення тощо) і при позитивних результатах хіміко-аналітичного визначення вмісту активного хлору в розчині.

### 3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ

**3.1. Об'єкти застосування.** Розчини засобу “Соліклор” застосовують для дезінфекції: виробів медичного призначення багаторазового та одноразового використання (перед утилізацією), а також інших інструментів, призначених для виконання лікувальних, діагностичних та косметологічних процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок (в т.ч. для дезінфекції, поєданої з достерилізаційним очищеннем); предметів догляду хворих із тих самих матеріалів (в т.ч. грілки, наконечники для спринцівок, підкладні клейонки, судна тощо); білизни натільної та постільної, спеціального, медичного та захисного одягу, в т.ч. одноразового використання перед утилізацією; посуду столового, аптечного та лабораторного; предметів для миття посуду; іграшок; поверхонь приміщень (в т.ч. в кухонних зонах переробки і приготування продуктів харчування), холодильного обладнання, твердих меблів, медичних апаратів, пристрій, емностей для зберігання питної води, шкаралупи харчових яєць; санітарно-технічного обладнання (в т.ч. ванн для бальнеологічних процедур, чаш басейнів, накопичувальних баків і поверхонь автономних туалетів та біотуалетів); гумових рукавичок, килимків, шкіряного взуття та банних капрів з синтетичних матеріалів; прибирального інвентарю; емностей для збирання, накопичування і зберігання відходів і сміття; медичних відходів (в т.ч. відпрацьованого перев'язувального матеріалу та біологічних рідин, зокрема, крові (в т.ч. згустків), сироватки, ліквору, мокротиння, промивних вод після полоскання зіву,

фекалій, сечі, змивної води після миття хвогою) та інших об'єктів; для облаштування дезінфекційних бар'єрів тощо.

### **3.2. Методи знезараження окремих об'єктів.**

3.2.1. Дезінфекцію робочими розчинами засобу "Соліклор" проводять методами протирання, зрошення, занурення, замочування, заповнення і аерозольним; гранули засобу застосовують також методом засипання в рідину, що підлягає знезараженню та для чищення і дезінфекції санітарно-технічного обладнання. Використовують розчини кімнатної або підвищеної температури (45-50 °C – початкова температура розчину, яка не підтримується в процесі обробки).

3.2.2. Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни тощо), предмети обстановки (твірді меблі та ін.), поверхні медичних приладів, апаратів, устаткування, об'єкти транспорту протирають ганчір'ям, яке змочене розчином засобу або зрошують при нормі витрати розчину 100 мл/м<sup>2</sup> поверхні, що піддається обробці. Після закінчення дезінфекції методом зрошення приміщення провірюють протягом 15 хв.

3.2.3. Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази та ін.) протирають ганчір'ям, щіткою або йоржем, змоченим в розчині, або зрошують розчином засобу. Після попереднього промивання поверхні водою обробка одноразова. Норма витрати розчину 100 мл/м<sup>2</sup> на одноразову обробку. Можливе також чищення обладнання гранулами засобу.

Дезінфекцію біотуалетів і поверхонь кабін автономних туалетів здійснюють розчином засобу в концентрації 0,06% при експозиції 60 хв. Знезараження вмісту баків автономних туалетів здійснюють заливанням розчином в концентрації 0,2% на 120 хв. при співвідношенні 2 об'єми розчину на 1 об'єм виділень.

3.2.4. Предмети догляду хворих та іграшки (крім м'яких) занурюють в розчин засобу, перешкоджаючи їх спливанню або протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу. Після закінчення дезінфекції їх промивають водою протягом 3 хв.

3.2.5. Білизну (за винятком білизни з нестійким фарбуванням (кольорової), а також вовняної, шовкової та виготовленої з синтетичних волокон) замочують в розчині з розрахунку 4 л на 1 кг сухої білизни (при особливо небезпечних інфекціях для забрудненої білизни 5 л/кг). Після закінчення дезінфекції білизну перуть і полощуть.

Засіб у вигляді гранул або таблеток може бути використаний для покращення якості прання, відбілювання і санації при пранні білизни у пральніх машинах побутового або промислового типу. Засіб сумісний з порошкоподібними пральними засобами, у складі яких відсутні інші біоцидні речовини. Рекомендована витрата засобу для санації і відбілювання білизни становить 1-2 мірні ложки гранул або 3-4 таблетки для пральної машини, розрахованої на завантаження 4-6 кг білизни, температура прання 40-45 °C, тривалість прання 30-60 хвилин. Не рекомендується завантажувати засіб у середину білизни.

3.2.6. Лабораторний посуд, в т.ч. в мікробіологічних лабораторіях (пробірки, піпетки, предметні та покривні скельця, циліндри, колби, флакони, чашки Петрі, планшети для імунологічного аналізу, гумові груші, шланги тощо) знезаражують методом повного занурення в розчин засобу. Після закінчення експозиції посуд ретельно промивають проточною водою протягом 3 хв.

3.2.7. Посуд столовий звільняють від залишків їжі і повністю занурюють в робочий розчин з розрахунку 2 л розчину на 1 комплект. Після закінчення дезінфекції посуд промивають водою протягом 3 хв.

Предмети для миття посуду (щітки, йоржі, мочалки, губки й ін.) занурюють в робочий розчин засобу, по закінченні експозиції прополоскують і висушують.

3.2.8. Дезінфекцію виробів медичного призначення здійснюють в емальованих (без пошкодження емалі), скляних або пластмасових ємностях. Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, включаючи стоматологічні інструменти (в т.ч. з низьковуглецевої сталі, нікельованих металів), скла, полімерних матеріалів після використання повністю занурюють в розчин засобу. Роз'ємні вироби обробляють в розібраному вигляді, канали і порожнини повністю заповнюють розчином, уникаючи утворення повітряних пробок. Вироби, які мають замкові частини, занурюють в розчин

в розкритому вигляді і роблять декілька робочих рухів. Ємність, в якій проводиться дезінфекція, щільно закривають кришкою. Після дезінфекції вироби промивають проточною водою протягом 3-х хвилин.

Перукарське, манікюрне, педікюрне і косметологічне приладдя дезінфікують методами, встановленими для виробів медичного призначення.

3.2.9. Для дезінфекції, поєднаної з дестерилізаційним очищеннем ручним методом, вироби медичного призначення, лабораторний посуд, перукарські, манікюрні і косметологічні інструменти і приладдя занурюють в робочий розчин засобу кімнатної температури. Роз'ємні вироби перед зануренням у робочий розчин засобу розбирають. Внутрішні канали та порожнини виробів повністю заповнюють робочим розчином за допомогою шприців безперервного типу дії або інших допоміжних засобів. Крізь голки з початку прокачують робочий розчин після чого занурюють у робочий розчин. Смільність із замоченими у робочому розчині засобу виробами щільно закривають кришкою.

Після закінчення експозиції у цьому ж робочому розчині здійснюють миття кожного виробу за допомогою йоржа чи ватно-марлевого тампону, внутрішні канали та порожнини виробів миють методом прокачування крізь них робочого розчину за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача, крізь голки прокачують робочий розчин.

Ополіскують вироби з початку проточною питною водою, а потім дистильованою водою. Внутрішні канали та порожнини виробів та голок обполіскують шляхом прокачування крізь них води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Після ополіскування вироби висушують (наприклад, у сушкильній шафі при температурі 85°C (граничне відхилення +2/-10°C) до повного видалення вологи.

Режими дезінфекції, поєднаної з дестерилізаційним очищеннем, вказано в таблиці 14.

Для дезінфекції виробів медичного призначення, посуду, перукарських, манікюрних і косметологічних інструментів і приладдя робочі розчини можуть бути використані багаторазово в межах терміну придатності (5 діб) при відсутності зміни початкового зовнішнього вигляду розчину (відсутність помутніння, осаду або забарвлення тощо) і при позитивних результатах хіміко-аналітичного визначення вмісту активного хлору в розчині.

3.2.10. Прибиральний матеріал занурюють у розчин засобу. Після закінчення дезінфекції його перуть, полощуть і висушують.

3.2.11. Гумові килимки, шкіряне взуття, банні капці з синтетичних матеріалів знезаражують способами протирання, занурення або зрошення.

3.2.12. Для заповнення дезінфекційних бар'єрів (дезінфекційних килимків) використовують розчин засобу в концентрації 0,03% (за активним хлором). Розчин доливають по мірі необхідності (при зменшенні рівня). Періодичність заміни робочого розчину в дезінфекційному бар'єрі залежить від інтенсивності його використання і здійснюється не рідше ніж 1 раз на 3 доби.

3.2.13. Біологічні виділення (в т.ч. фекалії, кров та її згустки, ліквор, сироватку, мокротиння та ін.), що зібрани в ємність, при інфекціях бактерійної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити і СНІД) і грибкової (включаючи кандидози і дерматофітії) етіології знезаражують такими способами:

- заливають розчином засобу із розрахунку 2 об'єми розчину на 1 об'єм виділень, ємність закривають кришкою;

- засипають гранулами: мокроту і фекалії на 2 години, а сироватку крові на 4 години (при первинному однократному початковому перемішуванні гранул в знезаражуваному субстраті) при співвідношенні гранул (г) до субстрату (мл) як 1 : 10 або на 24 години при співвідношенні гранул (г) до субстрату (мл) як 1 : 15 (за відсутності початкового перемішування суміші).

3.2.14. Рідкі виділення, кров, плазму, інші біологічні рідини на поверхні засипають гранулами засобу, після повного всмоктування рідини збирають їх в окрему місткість або одноразові пакети із додержанням заходів протиепідемічної безпеки (використання

гумових рукавичок та фартуха). Поверхню, на якій знаходились виділення, протирають 0,06% розчином засобу. Зібрані в окремій місткості або одноразовому пакеті гранули чрез 60 хв. утилізують. Ємність слід продезінфікувати.

Кров, розлиту на поверхні можливо також обробляти 1,0 % (за активним хлором) розчином засобу.

3.2.15. Обробку санітарного транспорту здійснюють методом протирання ганчір'ям, змоченим робочим розчином засобу або методом зрошення із розрахунку 100 мл/м<sup>2</sup> до повного змочування поверхонь (див. п.3.2.2.). При обробці санітарного транспорту слід керуватись режимами для обробки поверхонь, які вказані в таблицях № 9–13 (залежно від виду інфекції).

3.2.16. Медичні відходи (використані вироби медичного призначення одноразового використання і використаний перев'язувальний матеріал) збирають в окрему місткість і знезаражують методом занурення в робочий розчин засобу за режимом відповідної інфекції.

Контейнери для збору медичних відходів обробляють способом протирання або зрошення за режимом відповідної інфекції.

3.2.17. Дезінфекцію об'єктів при різних інфекціях у лікувально-профілактичних закладах та вогнищах інфекційних захворювань проводять за режимами, зазначеними у таблицях 9-13.

Профілактична дезінфекція в лікувально-профілактичних закладах, готелях, гуртожитках, санаторіях і будинках відпочинку, на об'єктах залізничного та громадського транспорту, на підприємствах ресторанного господарства, торгівлі, в громадських закладах тощо здійснюється за режимами, наведеними в таблиці 9.

Дезінфекцію в протитуберкульозних установах, осередках туберкульозу і в пенітенціарних установах здійснюють за режимами, вказаними в таблиці 11.

Генеральні прибирання в ЛПЗ різного профілю і дитячих дошкільних закладах здійснюють за режимами, вказаними в таблиці 15.

Дезінфекцію в перукарнях, косметологічних салонах, пральніх, спортивних закладах, в лазнях, саунах, басейнах, душових, роздягальнях, санітарних кімнатах, гідромасажних ваннах та в інших місцях, де існує можливість інфікування збудниками дерматомікозів проводять за режимами, вказаними в таблиці 12.

3.2.18. Режими дезінфекції при особливо небезпечних інфекціях (в т.ч. холера, чума, туляремія) вказано в таблиці 13.

Дезінфекцію приміщень, виробів медичного призначення, білизни, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю при інфекціях, викликаних спороутворюючими мікроорганізмами роду *Bacillus*, в т.ч. при сибірці, проводять розчинами засобу в концентрації 3,0% за активним хлором при експозиції 120 хвилин. Норма витрати розчину при обробці поверхонь не менше 300 мл/м<sup>2</sup>.

3.2.19. Профілактичну дезінфекцію об'єктів транспорту (крім санітарного) проводять за режимами при бактеріальних інфекціях (таблиця 9) методом протирання або зрошення розчином засобу із розрахунку 100 мл /м<sup>2</sup>.

3.2.20. Робочі розчини засобу використовують для дезінвазії лабораторного посуду і відходів (відпрацьовані предметні скельця, піпетки, пробірки, скляні палички та ін., фекалії, жовч, мокротиння, осад стічних вод, тампони, паперові фільтри, дерев'яні палички та ін.), поверхонь приміщень і лабораторного устаткування, предметів побуту, іграшок, контамінованих збудниками паразитарних захворювань (яйцями й личинками гельмінтів, цистами й ооцистами найпростіших).

3.2.20.1. Лабораторний посуд (відпрацьовані предметні скельця, піпетки, корки, пробірки, скляні палички, стаканчики і та ін.) після використання занурюють протягом робочого дня в ємність з розчином засобу в концентрації 0,3% за активним хлором. Заключне знезараження лабораторного посуду здійснюється методом кип'ятіння в 0,3% (за активним хлором) розчині засобу протягом 30 хвилин від моменту закипання. Після дезінфекції посуд миють й стерилізують.

3.2.20.2. Біологічні відходи (фекалії, жовч, мокротиння, осад стічних вод і та ін.) заливають розчином засобу в концентрації 1,0% (за активним хлором) з розрахунку 2

об'єми розчину на 1 об'єм біологічних виділень, перемішують і витримують 60 хвилин. По закінченні експозиції відходи утилізують.

3.2.20.3. Відходи з текстильних матеріалів (ватні й марлеві тампони), паперові фільтри і одноразові дерев'яні палички занурюють в 0,3% (за активним хлором) розчин засобу на 120 хвилин, після закінчення експозиції утилізують.

3.2.20.4. Дезінвазія поверхонь приміщень, лабораторного устаткування (центрифуги, мікроскопи, холодильники та ін.) проводиться методом протирання ганчір'ям, змоченим розчином засобу в концентрації 0,06% (за активним хлором), експозиція 60 хвилин. Прибиральний матеріал (ганчірки, щітки) знезаражують методом кип'ятіння в 0,3% (за активним хлором) розчині засобу протягом 30 хвилин від моменту закипання.

3.2.20.5. Санітарно-технічне обладнання, ручки дверей, горщики, тверді іграшки (гумові, пластмасові й дерев'яні), протирають ганчір'ям, змоченим 0,06% (за активним хлором) розчином засобу, або зрошують або занурюють у розчин, експозиція 60 хвилин. М'які меблі, іграшки, килимові покриття й інші предмети чистять щітками, змоченими в 0,06% (за активним хлором) розчині засобу, експозиція 60 хвилин (попередньо перевіряють стійкість матеріалу і фарбування до дії хлору). Після закінчення експозиції іграшки полощуть проточною водою не менше 3 хвилин і висушують.

3.2.21. Знезараження поверхонь і об'єктів у моргах, приміщеннях і будівлях патологоанатомічних служб, судово-медичної експертизи, в колумбаріях, крематоріях, похоронних бюро та будинках інших організацій, що надають ритуальні й похоронні послуги рекомендується здійснювати розчинами засобу за режимами таблиці 11.

3.2.22. Для боротьби з пліснявими грибами (в т.ч. A.niger в споровій формі) на уражених пліснявою поверхнях розчини засобу "Соліклор" використовують за режимами, вказаними в таблиці 14. Уражені поверхні зрошують розчином засобу і витримують експозицію, після чого очищають поверхню від ознак враження пліснявою і повторно обробляють поверхню розчином засобу. Дають розчину висохнути. Обробку повторюють щотижня або при появі ознак плісняви. Для попередження розповсюдження спор плісняви не рекомендується механічне очищенння поверхонь з ознаками враження пліснявою без попередньої дезінфекції розчином засобу "Соліклор".

Для попередження появи плісняви використовують розчин засобу "Соліклор" в концентрації 0,015 % (за активним хлором).

3.2.23. Дезінфекцію на харчопереробних підприємствах поверхонь виробничих і допоміжних приміщень, технологічного, холодильного та іншого обладнання, ємностей, резервуарів, трубопроводів, інвентарю, тари, столового і кухонного посуду, шкаралупи харчових яєць, фруктів і овочів, прибирального інвентарю, текстильних виробів (в т.ч. спецодягу, платок, сирних торбинок та ін.), засобів для миття посуду тощо здійснюють методами протирання, зрошення, заповнення (в т.ч. з циркуляцією розчину і СІР-системах), замочування, занурення. Використовують робочі розчини засобу кімнатної або підвищеної температури (початкова температура  $40\pm5^{\circ}\text{C}$ , яка не підтримується у подальшому) в концентрації від 0,0075% до 0,3% (за активним хлором) при експозиції від 7 хвилин до 120 хвилин. Конкретні режими визначено у відповідних інструктивно-методичних документах.

При дезінфекції методом занурення, заповнення і циркуляційні обробці в СІР-системах можливе багаторазове використання робочих розчинів в межах терміну придатності за умови відсутності ознак його забруднення (відсутність осаду, помутніння, нальоту на стінках, відсутність зміни кольору розчину) і при позитивних результатах хіміко-аналітичного визначення вмісту активного хлору в розчині. При зниженні вмісту активного хлору у розчині нижче нормативного можливе підвищення його концентрації за рахунок додавання засобу. Розрахунок необхідної кількості засобу здійснюється згідно додатку 1.

3.2.24. Санітарна обробка шкаралупи яєць, перед їх у використанням виробництві, може здійснюватись такими методами:

А). після попереднього замочування у воді не менше 10 хвилин методом одноетапного миття і дезінфекції у робочому розчині засобу «Соліклор» (у формі гранул з мийним компонентом) в концентрації 0,015% (за активним хлором) при експозиції 20 хвилин або в концентрації 0,03% (за активним хлором) при експозиції 10 хвилин.

Б). після попереднього замочування і миття яйця занурюють на 30 хвилин у розчин засобу «Соліклор» з концентрацією активного хлору 0,004% приготовленого із гранул (1 г гранул з вмістом активного хлору 45% на 10 л води або 1,3 г гранул з вмістом активного хлору 30% на 10 л води) або на 2 хвилини у розчині з концентрацією активного хлору 0,015%, приготовленого із гранул або таблеток. Такий розчин може бути використані багаторазово за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (відсутність помутніння, осаду або забарвлення тощо) в межах терміну придатності.

В). після попереднього замочування і миття яйця рясно зрошують розчином засобу «Соліклор» з концентрацією активного хлору 0,015% при експозиції 5 хвилин у або з концентрацією активного хлору 0,03% при експозиції 2 хвилини, приготовленого із гранул або таблеток.

Перед використанням яйця ополіскують питною водою.

3.2.25. Дезінфекцію внутрішніх поверхонь ємностей для зберігання питної води (цистерни, бочки, каністри та ін.) за епідемічними показаннями проводять способом зрошення, протирання або заповнення ємностей розчином засобу у концентрації 0,015% (за активним хлором) при експозиції 60 хвилин.

### 3.2.26. Дезінфекція водопровідних споруд при їх будівництві та експлуатації.

3.2.26.1. Дезінфекція водопровідних споруд засобом "Соліклор" (свердловин, резервуарів і напірних баків, відстійників, освітлювачів, фільтрів, водопровідної мережі) може здійснюватись з профілактичною метою (перед прийняттям до експлуатації нових споруд, після періодичної чистки, після ремонтно-аварійних робіт), а також за епідемічними показаннями (у випадку забруднення споруд, у наслідок чого створюється загроза виникнення спалахів кишкових інфекцій).

Для підвищення надійності та скорочення тривалості дезінфекції рекомендується застосовувати розчин засобу "Соліклор" з концентрацією активного хлору 75-100 мг/дм<sup>3</sup> при контакті 5-6 годин. При використанні розчинів з меншою концентрацією активного хлору (40-50 мг/дм<sup>3</sup>), тривалість контакту становить 24 години та більше.

Перед дезінфекцією водопровідних споруд в усіх випадках обов'язково проводиться їх попередня очистка і промивка. Водопровідну мережу, очистка якої ускладнена, інтенсивно промивають на протязі 4-5 годин при максимально можливій швидкості води (не менше 1 м/сек).

Дезінфекція артезіанських свердловин перед введенням їх до експлуатації виконується у випадках, коли після їх промивки якість води за мікробіологічними показниках не відповідає чинним нормативним документам.

Дезінфекцію здійснюють у два етапи: з початку надводної частини свердловини, потім - підводної частини. Для знезараження надводної частини у свердловині на кілька метрів нижче статичного рівня встановлюють пневматичну пробку, вище якої свердловину заповнюють розчином засобу "Соліклор" з концентрацією активного хлору 50-100 мг/дм<sup>3</sup> в залежності від ступеня забруднення. Після 3-6 годин контакту пробку виймають і за допомогою спеціального змішувача вводять розчин засобу "Соліклор" у підводну частину свердловини з такого розрахунку, щоб концентрація активного хлору, після змішування з водою, була не менше 50 мг/дм<sup>3</sup>. Через 3-6 годин контакту здійснюють відкачування до зниження у воді помітного запаху хлору, після чого відбирають пробу води для контрольного бактеріологічного аналізу.

Примітка: розрахунковий об'єм розчину приймається більше ніж об'єм свердловини при дезінфекції надводної частини - в 1,2-1,5 рази, підводної частини - в 2-3 рази.

3.2.26.2. Дезінфекцію резервуарів великого об'єму рекомендується проводити методом зрошення розчинами засобу "Соліклор" з концентрацією активного хлору 200-

250 мг/дм<sup>3</sup> із розрахунку 0,3-0,5 дм<sup>3</sup> розчину на 1 м<sup>2</sup> внутрішньої поверхні резервуару. Через 1-2 години поверхні промивають чистою водопровідною водою, зливаючи відпрацьований розчин через зливний випуск.

Робота повинна проводитись з дотриманням встановлених заходів безпеки, перед входом до резервуару має знаходитись ємкість з розчином засобу "Солікпор" для обмивання взуття.

Напірні баки малої ємкості слід дезінфікувати об'ємним методом, заповнюючи їх розчином засобу "Солікпор" з концентрацією активного хлору 75-100 мг/дм<sup>3</sup>. Після контакту 5-6 годин розчин зливають через випуск для брудної води і промивають бак чистою водопровідною водою до отримання вмісту у промивній воді залишкового хлору 0,3-0,5 мг/дм<sup>3</sup>. Аналогічно здійснюють дезінфекцію відстійників, змішувачів, а також фільтрів після їх ремонту і завантаження.

3.2.26.3 Дезінфекція водопровідної мережі здійснюється шляхом заповнення труб розчином засобу "Солікпор" з концентрацією активного хлору 75-100 мг/дм<sup>3</sup> (у залежності від ступеню забруднення мережі, її зношеності та санітарно-епідемічної ситуації).

Введення розчину засобу в мережку здійснюють до тих пір, доки у точці, яка найбільше віддалена від місця його подачі, концентрація активного хлору у воді буде не менше 50% від заданої концентрації активного хлору. З цього моменту подальшу подачу розчину припиняють і залишають заповнену розчином мережу не менше ніж на 6 годин. Воду з розчином по закінченні контакту зливають з мережі, промивають її чистою водопровідною водою.

Наприкінці промивання (при вмісті у воді 0,3-0,5 мг/дм<sup>3</sup> активного хлору) з мережі відбирають проби для контрольного бактеріологічного аналізу.

Дезінфекція вважається закінченою при позитивних результатах аналізу двох проб послідовно відібраних в даній точці.

Примітка: розрахунковий об'єм розчину засобу "Солікпор" для знезараження мережі визначається по внутрішньому об'єму труб з додаванням 3-5 % на імовірний розлив. Об'єм 10 м труб при діаметрі 50 мм складає 0,2 м<sup>3</sup>, 75 мм - 0,5 м<sup>3</sup>, 100 мм - 0,8 м<sup>3</sup>, 150 мм - 1,8 м<sup>3</sup>, 200 мм - 3,2 м<sup>3</sup>, 250 мм - 5 м<sup>3</sup>.

### 3.2.27. Методи дезінфекції окремих об'єктів в плавальних басейнах.

3.2.27.1. Щоденній дезінфекції в плавальних басейнах підлягають приміщення чаші басейну, туалету, душових, роздягалень, місця загального користування та підсобні приміщення.

В приміщеннях ванни басейну знезараженню підлягають: чаша басейну, обхідні доріжки, трапи, спортивні тумби, лавки, ножні ванни; в роздягальнях, душових, санвузлах: підлога, стіни, двері, ручки дверей, шафи, лавки, гумові килимки, дерев'яні решітки, крані, санітарно-технічне обладнання; в місцях загального користування та підсобних приміщеннях: підлога, стіни, двері, ручки дверей, предмети умеблювання.

3.2.27.2. Поверхні в приміщенні чаші басейну, роздягальнях, душових, санвузлах, в місцях загального користування та підсобних приміщеннях протирають ганчір'ям, що змочене в розчині засобу або зрошують при нормі витрати розчину 100 мл/м<sup>2</sup>.

3.2.27.3. Дезінфекція чаші басейну проводиться після зливу води та її механічного чищення і миття дозволеними для цього мийними засобами з наступним ополіскуванням водою зі шлангу.

Дезінфекція чаші басейну та ніжних ванн здійснюється методом протирання або зрошенню при нормі витрати розчину 100 мл/м<sup>2</sup>.

Санітарно-технічне обладнання чистять йоржем або щіткою, змоченими розчинами засобу. Гумові килимки і дерев'яні решітки знезаражують методом протирання або зрошування.

Прибиральний інвентар після використання замочують у розчині засобу. По закінченні дезінфекції його промивають водою і висушують.

Для боротьби з пліснявою використовується розчин засобу «Солікпор» з концентрацією активного хлору 0,1%. Уражені поверхні попередньо механічно очищають від грибкового

нальоту та протирають ганчір'ям, яке змочене розчином засобу. Дають розчину висохнути. Обробку повторюють щотижня або при появі ознак плісняви. Для попередження появи плісняви використовують розчин засобу з концентрацією активного хлору 0,015%.

3.2.27.4. Режими дезінфекції об'єктів у басейнах наведено у таблиці 7.

**Таблиця 7.** Режими дезінфекції окремих об'єктів у плавальних басейнах розчинами засобу «Соліклор»

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, % за активним хлором	Час знезараження хв.	Спосіб знезараження
Поверхні ванни басейну і ніжних чаші	0,06 0,1	60 30	Протирання або зрошування
Поверхні приміщення чаші басейну, роздягалень, душових, санузлів	0,06 0,1	60 30	Протирання або зрошування
Поверхні місць загального користування і підсобних приміщень	0,015 0,03 0,06	60 30 15	Протирання
Санітарно-технічне обладнання*	0,1	60	2-разове протирання або зрошування
Гумові килимки, дерев'яні решітки	0,1	60	Протирання або зрошування
Шкіряне взуття, банні капці з полімерних матеріалів	0,1	60	Занурення
Прибиральний інвентар	0,2	120	Занурення

\* Знезараження може проводитися з додаванням 0,5% мийного засобу

### 3.2.28. Знезараження води в плавальних басейнах.

Знезараження води, яка подається у чаши плавальних басейнів, є обов'язковим і проводиться у відповідності з чинними нормативно-методичними документами.

Для знезараження води у басейнах необхідну кількість таблеток засобу «Соліклор» попередньо розчиняють у спеціально виділеній промаркованій ємності, після чого цей розчин додають у воду при заповненні басейну або в рециркуляційну систему перед фільтрами. Під час експлуатації басейну необхідно здійснювати періодичний контроль вмісту у воді залишкового вільного хлору.

Кількість засобу, що вводиться, визначається із розрахунку підтримання постійної концентрації у воді залишкового вільного хлору в спортивних плавальних басейнах на рівні 0,3–0,5 мг/дм<sup>3</sup>, в басейнах колективного масового користування - 0,5–0,7 мг/дм<sup>3</sup>.

При значному денному навантаженні басейну у нічний час допускається підвищення концентрації залишкового хлору до 1,5 мг/дм<sup>3</sup>. У цьому випадку перед користуванням водою концентрація хлору повинна бути знижена до 0,7 мг/дм<sup>3</sup> з одночасним провітрюванням приміщення. Під час експлуатації басейну перевищення концентрації хлору у воді не допускається.

Вміст залишкового вільного хлору визначається згідно з ГОСТ 18190-72 методом йодометричного титрування. Для спрощення та скорочення термінів проведення хіміко-аналітичного дослідження визначення концентрації вільного хлору рекомендується проводити за допомогою портативних наборів, приладів, індикаторних смужок виробництва фірми “LaMotte” (США) або аналогічними виробами.

Періодичність контролю визначається чинними нормативними документами щодо експлуатації басейнів.

### **3.2.29. Знезараження питної води при децентралізованому водопостачанні.**

Засіб «Соліклор» (таблетки) використовується для проведення робіт з метою забезпечення людей, тварин та птахів питною водою якісною за мікробіологічними показниками, як з профілактичною метою, так і за показаннями, а також для обробки води для поливу рослин в умовах захищеного ґрунту.

Засіб застосовується при децентралізованому водопостачанні для знезараження питної води, яка не містить осаду й планктону та має показник каламутності - не більше 9 мг/дм<sup>3</sup>, а поглинання хлору – не більше 8 мг/дм<sup>3</sup>.

Визначення необхідної дози засобу для знезараження води здійснюється шляхом пробного хлорування за такою методикою.

**Методика вибору робочої дози засобу «Соліклор» для знезараження питної води.** Орієнтовна концентрація активного хлору (далі - а.х.) у воді, необхідна для ефективного знезараження води, залежно від вихідної якості води, наступна:

- артезіанські води, води чистих гірських річок і озер: 1,0-1,5 мг а.х. на 1 л води;
- прозора вода колодязів і фільтрована вода малих річок: 1,5-2,0 мг а.х. на 1 л води;
- вода великих річок і озер: 2,0-3,0 мг а.х. на 1 л води;
- забруднена вода відкритих джерел: 5,0-10,0 мг а.х. на 1 л води.

Визначення необхідної дози засобу «Соліклор» (таблетки) для знезараження води здійснюється шляхом пробного хлорування за методикою, описаної нижче.

У першій ємності готують маточний розчин засобу «Соліклор» методом розчинення 1 таблетки засобу з вмістом активного хлору 1,5 г в 1,5 л води. В 1 мл отриманого розчину міститься 1 мг активного хлору. Цей розчин може бути використаний протягом 3 діб за умови зберігання в темному прохолодному місці.

У 3 інші ємності для проведення визначення наливають по 1 л води, що підлягає знезараженню. Потім в кожну з 3-х ємностей додають маточний розчин засобу «Соліклор» в кількості, яка відповідає якості оброблюваної води (див. вище), відповідно 1,0 мл, 2,0 мл і 3,0 мл для чистої води (або в 2 ємності відповідно 5,0 мл і 10,0 мл для брудної води). Для дозування маточного розчину можна використовувати медичний шприц.

Після додавання маточного розчину засобу «Соліклор» (таблетки) вміст ємностей ретельно перемішують і залишають на 30 хв. По закінченні вказаного часу у воді кожної ємності визначають зміст залишкового вільного хлору.

Для визначення залишкового хлору в колбу наливають 5 мл 10% розчину йодистого калію, 10 мл буферного розчину (Буферний розчин: pH = 4,6. Змішати 102 мл молярного розчину оцтової кислоти (60 г 100% кислоти в 1 л води) і 98 мл молярного розчину оцтовокислого натрію (136,1 г кристалічної солі в 1 л води) і довести до 1 л дистильованою водою, попередньо прокип'яченої) і вводять піпеткою 200 мл досліджуваної води з банки. Йод, що виділився, титрують 0,01 Н розчином гіпосульфіту до блідо-жовтого забарвлення, додають 1 мл 0,5% розчину крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синього забарвлення. Вміст залишкового хлору (мг / л) розраховують за формулою:

$$0,355 \times 5H,$$

де H - кількість гіпосульфіту (мл), витраченого на титрування.

У воду, що залишилася в банках, після 30 хвилинного контакту, для зв'язування надлишку хлору вводять по 1 мл 1% розчину гіпосульфіту натрію, попередньо стерилізованого кип'ятінням. Після цього проводять санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води.

**Примітка:** при відсутності можливості проведення санітарно-мікробіологічного аналізу, доза хлору встановлюється на підставі визначення в воді концентрації залишкового хлору і визначення інтенсивності запаху хлору у води.

Як робочу приймають ту дозу засобу, при внесенні якої через 30 хвилин контакту з водою вода має слабкий запах хлору. Якщо запах дуже сильний, то необхідно

повторити пробне хлорування, зменшивши кількість розчину засобу або збільшивши обсяг води.

Після встановлення ефективної дози проводять розрахунок кількості маточного розчину для знезараження необхідної кількості води, наприклад, на 5 л або 10 л води.

*П р и к л а д.* При пробному хлоруванні води встановлено, що ефективною дозою активного хлору для води конкретного джерела є доза 2 мг а.х. на 1 л води. Тоді, для того, щоб знезаразити 5 л води до неї необхідно додати 10 мл маточного розчину засобу «Соліклор» (таблетки) з вмістом 1 мг а.х. в 1 мл, перемішати і витримати експозицію 30 хвилин. Після закінчення експозиції вода може бути використана для господарсько-питних цілей.

За такою методикою засіб «Соліклор» (таблетки) застосовується для знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій і польових умовах з метою забезпечення людей питною водою якістю за мікробіологічними показниками, як з профілактичною метою, так і за епідемічними показаннями.

Орієнтовна концентрація активного хлору у воді, яка необхідна для ефективного знезараження води у залежності від її якості, та кількість засобу «Соліклор» (таблетки), яка необхідна для отримання відповідної концентрації активного хлору, вказана в таблиці 8.

**Таблиця 8.** Орієнтовна концентрація активного хлору у воді, для знезараження питної води засобом «Соліклор» при децентралізованому водопостачанні, у залежності від її якості

Природа джерела і якість води в ньому	Орієнтовна необхідна концентрація активного хлору у воді, мг/дм <sup>3</sup>	Кількість таблеток засобу «Соліклор» з вмістом активного хлору 1,5 г для створення необхідної концентрації активного хлору
Артезіанські води, води чистих гірських річок і озер	1,0-1,5	1 таб. на 1,0-1,5 м <sup>3</sup> води
Прозора вода колодязів і фільтрована вода малих	1,5-2,0	1 таб. на 0,75-1,0 м <sup>3</sup> води
Вода крупних річок і озер	2,0-3,0	2 таб. на 1,0-1,5 м <sup>3</sup> води
Забруднена вода відкритих джерел	5,0-10,0	3 таб. на 0,5-1,0 м <sup>3</sup> води

Через 30 хвилин після додавання засобу у чисту воду (артезіанські води, води чистих гірських річок і озер, прозора вода колодязів і фільтрована вода малих річок, вода крупних річок і озер) вміст залишкового вільного хлору у воді повинен становити 0,3 – 0,5 мг/дм<sup>3</sup>.

Обов'язковою вимогою при знезараженні забрудненої води відкритих джерел є попереднє її фільтрування через фільтр (наприклад, дрібний тканинний фільтр). Вміст залишкового вільного хлору через 30 хвилин після внесення засобу повинен складати 1,4-1,6 мг/дм<sup>3</sup>. Для видалення надлишку хлору та можливих побічних хлорвмісних вуглеводнів після закінчення експозиції знезараження рекомендується проводити фільтрацію води через активоване вугілля або інші сорбенти або кип'ятити її протягом 1 хвилини від закипання.

Визначення вмісту залишкового вільного хлору у воді проводиться згідно з ГОСТ 18190-72 методом йодометричного титрування.

Для спрощення та скорочення термінів проведення хіміко-аналітичного дослідження, а також у “польових умовах”, визначення концентрації вільного хлору

рекомендується проводити за допомогою портативних наборів, приладів, індикаторних смужок виробництва фірми "LaMotte" (США) або аналогічними виробами.

За відсутності можливості проведення вимірювання залишкового вільного хлору приблизну кількість його, як виключення, можна визначити за наявністю запаху хлору у воді. Ефективною вважається кількість засобу, при внесенні якої через 30 хвилин виявляється запах хлору. Якщо запах дуже сильний, то необхідно повторити пробне хлорування, зменшивши кількість засобу або збільшивши об'єм води.

Засіб «Соліклор» можна використовувати також для додаткового знезараження водопровідної води, призначеної для пиття та інших потреб, відповідно до режиму знезараження води, яка не потребує очистки.

### **3.2.30. Дезінфекція шахтних криниць.**

3.2.30.1. Дезінфекція шахтних криниць здійснюється відповідно до чинних нормативних документів, зокрема, Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанГіН 2.2.4-171-10).

3.2.30.2. **Дезінфекцію криниці за епідемічними показаннями** виконують в такій послідовності: 1. попередня дезінфекція криниці; 2 очищення криниці; 3 заключна (повторна) дезінфекція криниці.

Попередню дезінфекцію криниці починають з дезінфекції зовнішньої і внутрішньої поверхні зрубу методом зрошування розчином засобу «Соліклор», враховуючи режими дезінфекції при різних інфекціях, визначені у цих Методичних вказівках.

Після цього здійснюють дезінфекцію підводної частини криниці об'ємним методом, для чого засіб вносять в кількості, необхідній для створення у воді криниці концентрації активного хлору 100-150 мг/дм<sup>3</sup>. Після внесення засобу воду в криниці ретельно перемішують, наприклад, чистою рейкою або опускаючи та підіймаючи відро. Потім криницю закривають кришкою і залишають на 1,5-2 години, не допускаючи користування нею.

Після попередньої дезінфекції, криницю повністю звільняють від води, очищують від сторонніх предметів і мулу, що потрапили до неї, стінки зрубу очищують механічно від забруднень та наростань. Зруб криниці, за необхідності, ремонтують, після чого дезінфікують за методикою попередньої дезінфекції.

Після очистки, дезінфекції зрубу і наступного заповнення криниці водою до звичайного рівня, здійснюють заключну (повторну) дезінфекцію криниці об'ємним методом. Для цього визначають об'єм води в криниці і додають засіб у кількості, необхідній для досягнення концентрації активного хлору у воді 100-150 мг/дм<sup>3</sup>. Після внесення засобу воду в криниці ретельно перемішують на протязі 15 хвилин, потім криницю закривають на 6 годин, не допускаючи користування нею.

По закінченні вказаного часу визначають по запаху наявність залишкового активного хлору у воді. При відсутності запаху додають 1/4 або 1/3 первісної кількості засобу і очікують ще 3-4 години. Після цього воду можна використовувати для господарсько-побутових цілей.

Для прискорення усунення інтенсивного запаху хлору у воді, за необхідності використання її для пиття, проводять відкачування води будь-яким механічним способом або вносять гіпосульфіт натрію. Необхідну кількість його визначають дослідним шляхом з проби, відібраної з криниці, або вносять орієнтовно 100 мг гіпосульфіту натрію на 1 дм<sup>3</sup> води.

3.2.30.3. **При дезінфекції криниці з профілактичною метою** попередню дезінфекцію не здійснюють, дезінфекцію криниці здійснюють об'ємним способом після очистки криниці і дезінфекції зрубу.

### **3.2.31. Знезараження стічних вод.**

3.2.31.1. Засіб "Соліклор" застосовується для знезараження очищених стічних вод перед їх скиданням у водойми. Розрахункові дози активного хлору для знезараження стічних вод:

- після механічного очищення – 10 мг/дм<sup>3</sup>;

- після повного штучного біологічного очищення – 3 мг/дм<sup>3</sup>;
- після неповного штучного біологічного очищення – 5 мг/дм<sup>3</sup>.

Дозу активного хлору в кожному випадку слід уточнити в процесі експлуатації системи очищення стічних вод, виходячи з вимог, щоб у знезараженій стічній воді після перебування у контактному резервуарі перед скидом у водойму колі-індекс не перевищував 1000, а індекс колі-фагу – 1000 БУО (бляшко-утворюючих одиниць)/дм<sup>3</sup> (або до мережі гранично допустимого скиду, встановленого в дозволі на спеціальне водокористування).

Для перемішування стічної води з робочим розчином засобу застосовують змішувачі, вибір типу яких залежить від витрати стічної води. Контакт робочого розчину зі стічною водою відбувається в контактних резервуарах, об'єм яких обчислюють в залежності від витрати стічних вод і тривалості контакту робочого розчину засобу зі стічною водою, яка повинна бути не менше 30 хвилин.

3.2.31.2. Стічні води інфекційних лікарень (відділень) підлягають знезараженню після механічної та біологічної очистки перед скиданням в зовнішню каналізацію. Необхідну кількість засобу "Соліклор" визначають з розрахунку забезпечення рівня залишкового хлору в стічній воді після менше 1,5 мг/л для стічної води після біологічної очистки та 4,5 мг/л для стічної води після механічного очищення протягом 30 хвилин.

Контроль якості знезараження стічних вод здійснюють щодня.

Зазначені методи для знезараження неочищених стічних вод неефективні.

Таблиця 9. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу "Соліклор" при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної етіології, крім туберкульозу (включаючи інфекції, викликані *S.aureus*, метіцилінрезістентним стафілококом (MRSA), *P.aeruginosa*, при дифтерії, менінгококовій інфекції, дизентерії, сальмонельозі, паратифі, черевному тифі) і респіраторних інфекціях вірусної етіології (в т.ч. герпесі, грипі всіх типів, парагрипі), включаючи внутрішньолікарняні інфекції

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Вироби медичного призначення із корозійностійких металів, скла, гум, пластмас*	0,06 0,1	60 30	Занурення
Предмети догляду хворих, виготовлені зі скла, пластмас, гуми, корозійностійких металів*	0,06 0,1	60 30	Занурення або протирання
Посуд без залишків їжі	0,015	15	Занурення
Посуд із залишками їжі	0,1 0,2	120 60	Занурення
Предмети для миття столового посуду (серветки, щітки, йоржі, губки, ганчір'я)	0,06	60	Занурення
Посуд лабораторний (пробірки, піпетки, предметні скельця), гумові груші, шланги тощо у мікробіологічних лабораторіях	0,1	120	Занурення
Білизна, не забруднена	0,015	60	Замочування
Білизна, забруднена виділеннями	0,15	120	Замочування
Іграшки	0,03	60	Занурення або протирання

Продовження таблиці 9

Поверхні приміщень, медичних приладів, транспортних засобів, жорстких меблів тощо**	0,01 0,015 0,03 0,06	90 60 30 15	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання**	0,03 0,06 0,1	120 60 30	Дворазове протирання або зрошення
Біологічні виділення (фекалії, сеча, слиз, мокротиння, блювотні маси, промивні води від попоскання зіву, залишки їжі)	0,2	120	Заливання: 2 об'єми розчину на 1 об'єм біологічних виділень
Посуд з-під виділень (судна, горшки)	0,06 0,1	90 60	Занурення
Медичні відходи з текстильних матеріалів (перев'язувальний матеріал, тампони, маски, одноразова білизна тощо)	0,15 0,3	120 45	Занурення або замочування
Вироби медичного призначення одноразового використання перед утилізацією, контейнери для збору медичних відходів і відпрацьованого матеріалу	0,06 0,1	60 30	Занурення або протирання
Прибиральний інвентар і матеріал	0,1 0,15	90 60	Замочування

\* В тому числі для об'єктів, забруднених кров'ю;

\*\* Для розчинів засобу, приготовлених з таблеток, знезараження може проводитись з додаванням 0,5% мийного засобу

Таблиця 10. Режими дезінфекції об'єктів розчином засобу "Солікплор" при інфекціях вірусної етіології (в т.ч. поліомієліт, рота-, ентеровірусні інфекції, а також інфекціях з парентеральним механізмом передачі, в т.ч. гепатит В і СНІД)

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Вироби медичного призначення із корозійностійких металів, скла, гуми (в т.ч. джгути), пластмас	0,06 0,1	60 30	Занурення
Предмети догляду хворих зі скла, пластмас, гуми, корозійностійких металів	0,06 0,1	60 30	Занурення або протирання
Посуд без залишків їжі	0,015	15	Занурення
Посуд із залишками їжі	0,1 0,2	120 60	Занурення
Предмети для миття столового посуду (серветки, щітки, губки)	0,06	60	Занурення
Посуд з-під виділень (судна, горшки, контейнери для збору та утилізації відходів і ін.)	0,06	90	Занурення, або протирання, або зрошення

Продовження таблиці 10

Посуд лабораторний (в т.ч. пробірки, піпетки, предметні скельця)	0,06 0,1	90 60	Занурення
Гумові груші, шланги тощо	0,1	120	Занурення
Білизна, забруднена виділеннями і кров'ю	0,15 0,3	120 60	Замочування
Білизна, не забруднена виділеннями	0,015 0,06	60 30	Замочування
Іграшки	0,06	30	Занурення або протирання
І поверхні приміщень, медичних пристрій, транспортних засобів, жорсткі меблі тощо*	0,01 0,015 0,03 0,06	90 60 30 15	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання*	0,03 0,06 0,06	120 60 30**	Протирання або зрошення
Прибиральний інвентар і матеріал	0,1 0,15	90 60	Замочування
Медичні відходи з текстильних матеріалів (тампони, маски, перев'язувальний матеріал, одноразова білизна тощо)	0,15 0,3	120 60	Занурення або замочування
Рукавички медичні одноразові (перед утилізацією)	0,06 0,1	60 30	Замочування
Біологічні виділення (в т.ч. фекалії, кров (в т.ч. згустки), сироватка, ліквор та ін.)	0,2 0,3	240 120	Заливання: 2 об'єми розчину на 1 об'єм виділень
Залишки їжі	0,2	120	
Сеча	0,2 0,3	120 30	

\*для робочих розчинів, приготовлених із засобу у формі таблеток, знезараження може проводитись з додаванням 0,5% мийного засобу;

\*\* за відсутності забруднення кров'ю.

Таблиця 11. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу "Соліклор" при туберкульозі

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Вироби медичного призначення із корозійностійких металів, скла, гум, пластмас	0,06 0,1	60 30	Занурення
Предмети догляду хворих з металу, скла, пластмас, гуми	0,06 0,1	60 30	Занурення або протирання
Посуд без залишків їжі	0,06	30	Занурення
Посуд із залишками їжі	0,2	120	Занурення
Предмети для миття столового посуду (серветки, щітки, губки)	0,06	60	Занурення

Продовження таблиці 11

Посуд лабораторний (пробірки, піпетки, предметні скельця), гумові груші, шланги тощо	0,2 0,3	60 45	Занурення
Посуд з-під виділень (судна, горшки, контейнери для збору та утилізації відходів і ін.)	0,06	90	Занурення, або протирання, або зрошення
Білизна, не забруднена виділеннями	0,06	60	Замочування
Білизна, забруднена виділеннями, кров'ю	0,2 0,3	120 60	Замочування
Іграшки	0,06 0,1	30 15	Занурення або протирання
Поверхні приміщень, медичних приладів, транспортних засобів, жорсткі меблі тощо*	0,06 0,1	60 30	Зрошення або протирання
Санітарно-технічне обладнання*	0,1 0,2	60 30	2-разове протирання або зрошення
Прибиральний інвентар	0,2 0,3	120 60	Замочування
Мокротиння в плювальницях	0,3	180	Занурення
Кров, сироватка, ліквор, виділення хворого (фекалії, сеча, блівотні маси, мокротиння тощо)	0,2 0,3	360 240	Заливання: 2 об'єми розчину на 1 об'єм матеріалу, що знезаражується
Залишки їжі	0,3	120	
Плювальниці, звільнені від мокротиння	0,3	120	Занурення
Медичні відходи (вироби медично-го призначення одноразового використання перед утилізацією)**	0,06	60	Занурення або замочування
Медичні відходи з текстильних матеріалів (перев'язувальні матеріали, тампони, маски, одноразова білизна тощо)	0,2 0,3	120 60	Занурення або замочування

\*Для розчинів засобу, приготовлених з таблеток, знезараження може проводитись з додаванням 0,5% мийного засобу;

\*\* в т.ч. знезараження медичних відходів та відпрацьованого перев'язувального матеріалу при інфекціях бактеріальної, вірусної та грибкової етіології.

Таблиця 12. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу "Соліклор" при кандидозах і дерматофітіях

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла, пластмас, гум,	0,1 0,2	60 30	Занурення
Поверхні приміщень, медичних приладів транспортних засобів, жорсткі меблі* тощо	0,06 0,1	60 30	Протирання або зрошування
Предмети догляду хворих	0,15	60	Занурення або протирання

Продовження таблиці 12

Посуд із залишками їжі**	0,1 0,2	60 30	Занурення
Посуд без залишків їжі**	0,03 0,06	60 30	Занурення
Предмети для миття столового посуду (серветки, щітки, губки)	0,06	60	Занурення
Посуд лабораторний (пробірки, піпетки, предметні скельця), гумові груші, шланги тощо	0,2	30	Занурення
Білизна, не забруднена виділеннями	0,06	60	Замочування
Білизна, забруднена виділеннями	0,15	60	Замочування
Іграшки	0,15	60	Занурення або протирання
Санітарно-технічне обладнання*	0,1	60	Протирання або зрошення
Гумові килимки, решітки з деревини	0,1	60	Протирання або зрошення
Шкіряне, гумове взуття, банні капці з полімерних матеріалів	0,1	60	Занурення
Прибиральний матеріал	0,01 0,15	90 60	Занурення

\*Для розчинів засобу, приготовлених з таблеток, знезараження може проводитись з додаванням 0,5% мийного засобу;

\*\* режим наведено для знезараження посуду при кандидозах.

Таблиця 13. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу "Соліклор" при особливо небезпечних інфекціях (в т.ч. холера, чума, туляремія)

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Вироби медичного призначення (в т.ч. одноразового використання) із корозійностійких металів, скла, гум, пластмас	0,1 0,2	120 60	Занурення
Предмети догляду хворих, виготовлені зі скла, пластмас, гуми, корозійностійких металів	0,03 0,06	120 60	Занурення або протирання
Білизна, не забруднена	0,06	60	Замочування
Білизна, забруднена виділеннями	0,2	120	Замочування
Посуд без залишків їжі	0,03	60	Занурення
Посуд із залишками їжі	0,2	120	Занурення
Посуд лабораторний (пробірки, піпетки, предметні скельця), гумові груші, шланги тощо у мікробіологічних лабораторіях	0,2	120	Занурення
Посуд з-під виділень	0,03	120	Занурення

Медичні відходи з текстильних матеріалів (перев'язувальні матеріали, тампони, маски, одноразова білизна тощо)	0,2	120	Занурення або замочування
Біологічні виділення (фекалії, сеча, слиз, мокротиння, блювотні маси, промивні води від полоскання зіву, залишки їжі)	0,2	120	Заливання: 2 об'єми розчину на 1 об'єм виділень
Біологічні виділення з кров'ю (в т.ч. фекалії, кров, згустки крові, блювотні маси тощо)	0,2 0,3	240 120	Заливання: 2 об'єми розчину на 1 об'єм виділень
Поверхні приміщені, медичних приладів, транспортних засобів, жорсткі меблі тощо*	0,03 0,06	60 30	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання*	0,06 0,1	120 60	Зрошення
Прибиральний інвентар	0,3	90	Замочування

\*Для розчинів засобу, приготовлених з таблеток, знезараження може проводитись з додаванням 0,5% мийного засобу;

Таблиця 14. Режими дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищеннем виробів медичного призначення, лабораторного посуду, перукарських, манікюрних і косметологічних інструментів і приладдя розчинами засобу "Соліклор"

Етап обробки	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Температура розчину, °C	Тривалість етапу, хв.
<b>Замочування</b> при повному зануренні виробів в розчин. Роз'ємні вироби занурюють в розібраному вигляді, за допомогою шприца, піпетки або іншого пристосування канали і порожнини виробів заповнюють розчином без повітряних пробок.	0,06 0,1	Не менше 18	60 <sup>1</sup> 60 <sup>2</sup>
<b>Миття</b> виробів в тому ж розчині за допомогою йоржа чи ватно-марлевого тампону. Внутрішні канали та порожнини виробів миють шляхом прокачування крізь них робочого розчину за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача, крізь голки прокачують робочий розчин		В тому ж розчині	2,0±0,1 <sup>3</sup> 0,5±0,1 <sup>4</sup>
<b>Ополіскування</b> проточною питною водою:	-	Не регламентується	3
<b>Ополіскування</b> дистильованою водою	-	Не регламентується	0,5±0,1

**Примітки:**

<sup>1</sup> на етапі замочування у розчині забезпечується дезінфекція виробів щодо збудників інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити, поліоміеліт, ВІЛ-інфекцію) і грибкової (кандидози) етіології;

<sup>2</sup> на етапі замочування у розчині забезпечується дезінфекція виробів щодо збудників інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити, поліоміеліт, ВІЛ-інфекцію) і грибкової (кандидози, дерматомікози) етіології;

<sup>3</sup> час обробки в розчині, приготовленому з таблеток;

<sup>4</sup> час обробки в розчині, приготовленому із гранул з миючим компонентом.

Таблиця 15. Режими знезараження об'єктів розчинами засобу "Соліклор" при проведенні генеральних прибирань в ЛПЗ різного профілю.

Профіль установи	Концентрація розчину, % (за активним хлором)	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Соматичні відділення й кабінети, палати, коридори, рекреації	0,015	60	Протирання або зрошення
	0,03	30	
Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади	0,06	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
Хірургічні, маніпуляційні, перев'язувальні, процедурні кабінети, стоматологічні, акушерські й гінекологічні відділення й кабінети, лабораторії	0,015	60	Протирання або зрошення
	0,03	30	
Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні установи	0,06	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
Інфекційні лікувально-профілактичні установи*	-	-	Протирання або зрошення
Обробка проти збудників анаеробних інфекцій	0,15	60	Протирання або зрошення
Дитячі дошкільні заклади	0,015 0,03	60 30	Протирання або зрошення

**Примітки:**

\* - генеральне прибирання проводиться за режимом відповідної інфекції.

\*\* - для розчинів засобу, приготовлених з таблеток, знезараження може проводитись з додаванням 0,5% мийного засобу.

Таблиця 16. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу "Соліклор" проти пліснявих грибів (в т.ч. A.niger в споровій формі).

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину за а.х., %	Час обробки, хв.	Спосіб обробки
Тверді непористі поверхні з металу, керамічної плитки та ін.: - не забруднені	0,1	60	Протирання або зрошення
	0,2	30	
- забруднені	0,2	60	Протирання або зрошення
	0,3	30	

Поверхні з фарбованої деревини: - незабруднені	0,2 0,3	60 30	Протирання або зрошення
- забруднені	0,3	60	
Поверхні з нефарбованої деревини: - незабруднені	0,2 0,3	180 60	
- забруднені	0,3	180	Замочування, протирання або зрошення
Прибиральний інвентар	0,3	120	

#### 4 ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

**4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом.** Всі роботи із засобом та його робочими розчинами слід проводити в спецодязі із захистом шкіри рук гумовими рукавичками. Роботи методом протирання розчинами в концентрації не більше 0,1 % (за активним хлором) можна проводити без використання засобів захисту органів дихання. При проведенні робіт методом протирання розчинами в концентрації вище 0,1 % (за активним хлором), а також при використанні розчинів засобу будь-якої концентрації методом зрошування слід застосовувати для захисту органів дихання універсальні респіратори типу РПГ-67 або РУ-60М із патроном марки "В", очі захищати герметичними окулярами.

При роботі з гранулами засобу слід уникати утворення пилу та використовувати додатково засоби захисту очей та органів дихання (респіратори типу "Лепесток" або аналогічні).

**4.2. Загальні застереження при роботі із засобом.** До роботи із засобом не допускаються особи з підвищеною чутливістю до хлору.

Під час виконання робіт з дезінфекції необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, забороняється вживати їжу, пити, палити. При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбрязкування та попадання засобу в очі і на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з милом. Забруднений одяг випрати перед повторним застосуванням.

**4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів.** Роботи із приготування розчинів засобу слід проводити у захисному одязі із використанням засобів захисту шкіри. Приготування робочих розчинів із засобу у формі таблеток не вимагає захисту органів дихання. Роботи із приготування робочих розчинів засобу у формі гранул проводять із використанням засобів захисту шкіри, очей та органів дихання (респіратори типу "Лепесток" або аналогічні).

Всі ємності з розчинами слід щільно закривати кришками.

**4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктів.** Роботи, що пов'язані із застосуванням засобу, необхідно проводити у приміщеннях, що добре провітрюються. Дезінфекцію поверхонь способом протирання розчинами, що містять від 0,015% до 0,1% активного хлору, можна проводити в присутності осіб, не причетних до проведення робіт.

Обробку методом протирання з використанням розчинів в концентрації вище 0,1% (за активним хлором), а також розчинів засобу будь-якої концентрації методом зрошування слід проводити за відсутності сторонніх осіб. Після дезінфекції за таких умов приміщення необхідно провітрити протягом 15 хв.

Дезінфекцію білизни, посуду, іграшок, виробів медичного призначення, медичних відходів методом занурення проводять у місткостях, щільно закритих кришками.

**4.5. Методи утилізації засобу.** Засіб з вичерпаним терміном придатності або некондиційний, внаслідок порушення умов зберігання і не придатний для використання за призначенням, передається на договірних умовах спеціалізованим організаціям або постачальнику для знешкодження або переробки.

Відпрацьовані робочі розчини засобу зливають у каналізацію.

У випадку розсипання засіб необхідно зібрати та направити на утилізацію. При розливанні робочих розчинів засобу необхідно зібрати їх ганчір'ям (піском, тирсою), а поверхню промити достатньою кількістю води. Зібрані в окремій місткості або одноразовому пакеті відходи направити на утилізацію. Прибирання засобу проводять із дотриманням правил особистої гігієни та техніки безпеки.

Розлиті робочі розчини змивають достатньою кількістю води.

Не допускати попадання засобу до ґрунту та поверхневих вод.

## 5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

**5.1. Ознаки гострого отруєння.** За умови недотримання застережних заходів у осіб з підвищеною чутливістю до активного хлору можлива поява ознак подразнення слизових оболонок очей (різь, слізозотеча) та органів дихання (дөре у горлі, кашель, часте дихання, виділення з носа), може виникнути головний біль.

**5.2. Заходи першої допомоги при подразненні органів дихання.** При появі ознак подразнення органів дихання постраждалого виводять з робочого приміщення на свіже повітря або в добре провітрюване приміщення, рот і носоглотку прополіскують водою, дають тепле пиття (наприклад, молоко або "Боржомі"). Доцільна інгаляція 2,0% розчином питної соди (1 чайна ложка питної соди на склянку води), у разі необхідності звернутись до лікаря.

**5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.** При попаданні засобу в очі слід промити їх під проточною водою протягом декількох хвилин. При подразненні слизових оболонок закапати в очі 30 % розчин сульфацилу натрію, у разі необхідності звернутись до лікаря.

**5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру.** При випадковому попаданні засобу на шкіру потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, при необхідності змастити шкіру пом'якшувальним кремом. При попаданні засобу на робочий одяг, потрібно його зняти, а ділянку шкіри під одягом ретельно промити проточною водою.

**5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку.** При попаданні засобу в шлунок дати випити потерпілому декілька склянок води, потім вжити 10-20 подрібнених таблеток активованого вугілля. При необхідності звернутися до лікаря.

## 6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

**6.1. Пакування засобу.** Залежно від вимог споживача засіб може упаковуватися в різні види тари. Зокрема, таблетки упаковуються в полімерні відра з ручками (наприклад, по 1800 штук), банки полімерні з кришкою по 1500, 750, 300, 250, 100 і штук, полімерні тузи по 20 штук, чарункову або безчарункову упаковку по 1 таблетці і 10 таблеток. Гранули упаковують в полімерні банки різної маси, зокрема, по 0,5 і 1 кг, а також у дозовані пакети (саше або стіки) масою від 5,0 г до 50,0 г. Разом з гранулами в банках можуть постачатись аксесуари для їх дозування (наприклад, мірні ложки). За узгодженням з споживачем можливі інші об'єми та форми упакування.

**6.2. Умови транспортування засобу.** Транспортування засобу здійснюють автомобільним, залізничним, авіаційним або морським транспортом згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

**6.3. Термін та умови зберігання засобу.** Засіб зберігають у пакуванні виробника, щільно закритим, у темних, критих, сухих приміщеннях, які не мають доступу для загального користування, окрім від продуктів харчування. Засіб та його робочі розчини не займисті, вибухобезпечні.

Гарантійний термін зберігання засобу - 5 років для таблеток і 3 роки для гранул від дати виготовлення за умови зберігання в закритому пакуванні виробника.

## **7. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСОБУ**

7.1. Засіб у вигляді таблеток і гранул контролюється за показниками, перелік і нормативні значення яких вказано у таблиці 17.

Таблиця 17. Перелік і нормативні значення показників якості засобу

Параметри	Нормативи для таблеток	Норматив для гранул
Зовнішній вигляд	Таблетка круглої форми, можуть мати на поверхні насічки для поділу таблеток	Дрібні гранули різної форми, вільно висипаються і не злипаються.
Колір	Білий	Білий
Запах	Характерний запах хлору	Характерний запах хлору
Вміст активного хлору, не менше	1,8 г, 1,5 г, 1,0 г, 0,5 г, 0,3 г, 0,15 г для таблеток відповідного номінального вмісту активного хлору	45% або 30%
Водневий показник (рН I) 1,0% (за препаратом) водного розчину	6,0 – 7,0	9,0 – 11,0*

\*Примітка: вказано значення для 1,0% (за препаратом) водного розчину, приготовленого з гранул з мийним функціональним компонентом. Для 1,0% (за препаратом) водного розчину, приготовленого з гранул без мийного функціонального компоненту нормативне значення показника pH 6,0-7,0.

### **7.2. Методи випробувань.**

#### **7.2.1. Визначення зовнішнього вигляду, кольору і запаху**

Зовнішній вигляд і колір визначають візуально. Запах оцінюють органолептично.

#### **7.2.2. Визначення масової частки активного хлору в засобі**

**7.2.2.1. Визначення масової частки активного хлору в засобі у формі таблеток** здійснюється методом йодометричного титрування на основі методики ГОСТ 11086-76.

*Устаткування, реагенти, розчини.*

- ваги лабораторні загального призначення по ГОСТ 24104-88, 2 класу точності з найбільшою межею зважування 200г;
- колба мірна 2-250-2 за ГОСТ 1770-74;
- колба Кн-1-250-0,1,2-2-250,1 за ГОСТ 25336-82.
- циліндр 1-50 або 3-50 за ГОСТ 1770-74;
- склянка СВ-14/08 за ГОСТ 25336-82;
- бюретка 1-1-2-25-0,1 за ГОСТ 29251-91;
- крохмаль розчинний для йодометрії за ГОСТ 10163-76;
- кислота оцтова марки ч.д.а. ГОСТ 61-75, 10% водний розчин;
- калію йодид за ГОСТ 4232, водний розчин з масовою часткою 10%;
- стандарт-титр 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.) натрію тіосульфату за ТУ 6-09-2540-87;
- вода дистилььована за ГОСТ 6709-74.

*Проведення аналізу.*

Одну таблетку засобу розчиняють у воді, переносять кількісно до мірної колби об'ємом 250 см<sup>3</sup>, доводять водою до мітки і ретельно перемішують. Аліквотний об'єм 5,0 см<sup>3</sup> приготовленого розчину переносять в колбу для титрування об'ємом 250 см<sup>3</sup> і послідовно додають 50 см<sup>3</sup> дистилььованої води, 5 см<sup>3</sup> оцтової кислоти і 10 см<sup>3</sup> розчину йодиду калію. Колбу закривають корком і залишають в темному місті на 3-5 хвилин. Потім корок над колбою змивають дистилььованою водою, після чого титрують йод, що

виділився 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до світло-жовтого кольору, додають декілька крапель розчину крохмалю і титрують до знебарвлення розчину (забарвлення не повинно з'являтись впродовж 1 хвилини).

#### Обробка результатів.

Вміст активного хлору (Х) в грамах на таблетку обчислюють за формулою:

$$X = \frac{0,003545 \times V \times 250}{a}$$

де: 0,003545 — маса активного хлору, що відповідає 1 см<sup>3</sup> 0,1Н розчину тіосульфату натрію, мг;  
V — об'єм розчину тіосульфату натрію, витрачений на титрування, см<sup>3</sup>;  
a — об'єм аліквоти, см<sup>3</sup>.

#### 7.2.2.2. Визначення масової частки активного хлору в засобі у формі гранул. Проведення аналізу.

5 г гранул засобу зважують з точністю до 0,0002 г і розчиняють в 150-200 см<sup>3</sup> води в мірній колбі об'ємом 250 см<sup>3</sup>, доводять об'єм до мітки водою, перемішують. Аліквотний об'єм 5 см<sup>3</sup> одержаного розчину переносять в колбу для титрування об'ємом 250 см<sup>3</sup> і послідовно додають 50 см<sup>3</sup> дистильованої води, 5 см<sup>3</sup> розчину оцтової кислоти і 10 см<sup>3</sup> розчину йодиду калію, перемішують. Колбу закривають корком і залишають в темному місті на 3-5 хвилин. Потім корок над колбою змивають дистильованою водою, після чого титрують йод, що виділився 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до світло-жовтого кольору, додають декілька крапель розчину крохмалю і титрують до знебарвлення розчину (забарвлення не повинно з'являтись впродовж 1 хвилини).

#### Обробка результатів.

Вміст активного хлору (Х) в (%) обчислюють за формулою:

$$X = \frac{V \times 0,003545 \times 250 \times 100}{m \times a},$$

де:

0,003545 — маса активного хлору, що відповідає 1 см<sup>3</sup> 0,1Н розчину тіосульфату натрію молярної концентрації точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.), г;  
V — об'єм розчину тіосульфату натрію, витрачений на титрування, см<sup>3</sup>;  
m — маса наважки, г;  
a — об'єм аліквоти, см<sup>3</sup>.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне 3-х визначень, розходження між якими не повинно перевищувати 10% при ймовірній вірогідності Р=0,95.

Можуть бути використані також і інші еквівалентні методики визначення активного хлору.

#### 7.2.2.3. Визначення масової частки активного хлору в робочих розчинах засобу «Соліклор»

Визначення масової частки активного хлору в робочих розчинах здійснюють методом йодометричного титрування на основі методики ГОСТ 1 1086-76.

#### Засоби вимірювання, реагенти, матеріали.

- Бюретка 1-1-2-25-0,1 за ГОСТ 29251-91.
- Піпетки.
- Колби конічні, колби мірні.
- Калій йодистий за ГОСТ 4232; водний розчин з масовою часткою 10%.
- Кислота сірчана марки ч.д.а. за ГОСТ 61-75; водний розчин з масовою часткою 10%.
- Натрію тіосульфат за ТУ 6-09-2540-72, 0,1н. водний розчин.

- Крохмаль розчинний за ГОСТ 10163-76; водний розчин з масовою часткою 0,5% готують за ГОСТ 4517-87 п.2.90.

#### *Проведення аналізу.*

В конічну колбу ємністю 100 см<sup>3</sup> вносять 10 см<sup>3</sup> йодистого калію та 10 см<sup>3</sup> сірчаної кислоти, після чого додають робочий розчин засобу «Соліклор», об'єм якого залежить від концентрації активного хлору в розчині, який досліджується.

#### **Рекомендована кількість робочого розчину засобу «Соліклор» для дослідження:**

Концентрація робочого розчину, що досліджується, % за активним хлором	Кількість робочого розчину, для дослідження, мл
0,0075%; 0,01%; 0,015%; 0,03%; 0,045%; 0,06%	70
0,1%; 0,15%	50
0,2%; 0,3%	10
1,0%; 3,0%	1-2

Колбу струшують, розчин при цьому набуває коричнево-бурого кольору.

Одержаній розчин титрують за допомогою мірної бюретки 0,1н розчином тіосульфату натрію до отримання світло-жовтого забарвлення. Додають 1 см<sup>3</sup> крохмалю, розчин при цьому набуває темно-синього забарвлення. Дотитровують далі 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до повного зникнення забарвлення.

#### *Опрацювання результатів вимірювання.*

Масову частку активного хлору (X) у відсотках обчислюють за формулою:

$$X = \frac{V \times 0,003545 \times 100}{b}, \text{ де}$$

0,003545 - маса активного хлору, що відповідає 1 см<sup>3</sup> розчину тіосульфату натрію концентрації точно C(Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> • 5H<sub>2</sub>O) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1Н), г;

V - об'єм розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування, концентрації точно C(Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> • 5H<sub>2</sub>O) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1Н), г;

b - об'єм робочого розчину засобу, взятий для титрування, см<sup>3</sup>.

Результат обчислюють за формулою з округленням до третього десяткового знаку.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне 3-х визначень, абсолютне розходження між якими не повинно перевищувати припустиме розходження, що дорівнює 0,001%. Припустима відносна сумарна похибка результату аналізу ±10%, при вірогідності, якій можна довіряти, Р=0,95.

7.2.2.4. Хіміко-аналітичне визначення концентрації активного хлору в засобі «Соліклор» і його робочих розчинах може бути здійснено з використанням портативних наборів, а також індикаторних тест-смужок виробництва фірми “LaMotte” (США) або інших з аналогічними метрологічними характеристиками за погодженням з виробником засобу “Baltiachemi OU” (Естонія).

#### **7.2.3. Визначення показника концентрації водневих іонів (рН).**

Для визначення показника концентрації водневих іонів (рН) засобу за ДСТУ 2207.1 (ГОСТ 22567.5) потенціометричним методом застосовують скляний та хлорсрібний електроди за ГОСТ 16287.

**Розрахунок кількості засобу «Соліклор», необхідного для підвищення активності (вмісту активного хлору) робочих розчинів.**

Кількість (шт.) таблеток (Т) і масу (г) гранул (Гр) для підвищення концентрації активного хлору в робочому розчині до нормативної, розраховують за формулою (1) для таблеток і формулою (2) для гранул:

$$T = \frac{V \times (C_p - C_{\text{вик.}}) \times 10}{M} \quad (1)$$

$$Гр = \frac{V \times (C_p - C_{\text{вик.}}) \times 1000}{C_{\text{зас.}}} \quad (2)$$

де:

$V$  - необхідний об'єм робочого розчину,  $\text{dm}^3$  (л), або кг;

$C_{\text{раб.}}$  - необхідна концентрація активного хлору в робочому розчині, %;

$C_{\text{исп.}}$  - концентрація активного хлору у використаному робочому розчині, %;

$M$  - маса активного хлору в одній таблетці, г;

$C_{\text{зас.}}$  - масова частка активного хлору в засобі, %.

Компанія «Baltiachemi OU»

Заступник директора



Андрій Котович



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАГВЕРДЖУЮ  
Голова Держприродспоживслужби  
Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
  
(підпис)  
№ М.П.

ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 02 2018 року

№ 602-123-20-5/ 3986

Об'єкт експертизи: засіб дезінфекційний «Соліклор» («Solikloor») - діюча речовини, мас., %: 80,0  
—85,0% натрієва сіль дихлоізоціанурової кислоти

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКІЗЕД, артикул: 3808 942000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади охорони здоров'я, учебово-виховні, спортивно-оздоровчі, комунально-побутові (в т.ч. об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства), промислові підприємства (в т.ч. харчопереробної, фармацевтичної та парфумерно-косметичної промисловості), заклади ресторанного господарства і торгівлі, житлові, громадські, культурно-освітні, видовищні, спортивно-оздоровчі споруди, всі види транспорту, місця постійного і тимчасового проживання, побут тощо.

Країна-виробник: компанія «Baltiachemi OU», Естонія, Maagi 5, Maardu, 74114, EESTI (Естонія),  
тел./ф.: +372-621-46-94, E-mail: info@baltiachemi.ee.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: компанія «Baltiachemi OU», Естонія, Maagi 5, Maardu, 74114, EESTI (Естонія),  
тел./ф.: +372-621-46-94, E-mail: info@baltiachemi.ee.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за параметрами гострої токсичності (при введенні в/ш, білі щурі, LD50 = 1200 мг/кг) засіб відноситься до 3 клас небезпеки; до 4 класу небезпеки при нанесенні на шкіру (кролі, LD50 reg cut = 2500 мг/кг) та при парентеральному введенні відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 “ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности”. Робочі розчини засобу концентрації 0,015-0,3% (за активним хлором) в умовах одноразової аплікації не спричиняють місцево-подразнювальної дії на шкіру та слизові оболонки очей. В умовах інгаляційної дії у вигляді пари належать до 4 класу малонебезпечних речовин за ступенем леткості. Засіб не володіє шкірно-резорбтивною, сенсибілізуючою та кумулятивною дією; гонадотропні, ембріотропні, ембріотоксичні, канцерогенні, мутагенні і тератогенні властивості відсутні. Контроль повітря

робочої зони при застосуванні засобу здійснювати за хлором: ГДКр.з. – 1 мг/м<sup>3</sup>; атмосферного повітря: ГДКа.п. – 0,1 мг/м<sup>3</sup> (максимальна разова), 0,03 мг/м<sup>3</sup> (середньодобова).

Засіб «Соліклор» («Solikloor») володіє вираженою протимікробною активністю відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (включаючи туберкульоз), інфекцій вірусної етіології включаючи гепатит А, гепатити (В,С), СНІД (ВІЛ), «пташиний грип» (A(H5N1), «свинячий грип» A(Y1N1), поліо-(поліоміеліт); інфекції грибкової етіології (кандидози, дерматоміози, плісняві грибки), має спороцидні властивості.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** зберігання, транспортування і використання продукту здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування засобу дезінфекційного «Соліклор» («Solikloor») з метою дезінфекції та дестерилізаційного очищення». Всі роботи з застосування засобу потрібно виконувати з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

Поточний нагляд: згідно вимог ««Методичних вказівок щодо застосування засобу дезінфекційного «Соліклор» («Solikloor») з метою дезінфекції та дестерилізаційного очищення».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Засіб дезінфекційний «Соліклор» («Solikloor»)** за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації засобу дезінфекційного.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа “Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 941 від 18 січня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії,  
директор ДУ "Інститут медицини праці  
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"

М.П.

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

